JABONES DE USO CORRIENTE Y SU COMPOSICION SERVICIO DE DERMATOLOGIA, HOSPITAL VARGAS

Dr. Tulio Briceño Maaz

Acne-aid: Aceite sulfonado de salvado de arroz 2,1% aceite sulfonado de semillas de mostaza 1,50%, parafina 2,70%. (Jabón Detergente).

Acnil: Jabón usado en el acné y la piel grasosa. Contiene: Azufre precipitado 3%. Acido Salicílico 1%.

Alkin: Jabón medicinal. Contiene: Solución de cloruro de alquildimetilbencilomonio- 10 grs. Grasa de coco-60 gr. Excipiente c.s.

Alquitranado Alder: Contiene 10% de aceite de cade, en base de jabón. Alderil: Resorcina 3%, ácido salicílico 3%, azufre 9% en base jabonosa.

Almay: Jabón de crema fría. Hipoalérgico sin perfume. Se compone de: Sales de sodio, ácidos grasos de aceite de coco y de sebo, agua, carbonato de sodio y silicatos, cera de abejas libre de jabón, Clicerina y Espermaceti.

Hipoalérgico Almay: Compuesto de crema fría, no contiene perfume.

Aveno-Bath: 25% de avena coloidal. (Bamboo-Aveno y leche-P.H, balanceado. Jabón natural de avena y leche).

Betadine: Jabón Líquido-Yodo polivinil-pirrolidona con 0,75 de yodo activo asociados a detergentes no fónicos.

Camay: Jabón con crema fría.

Cidal: Jabón con Irgasán; 2% de hexaclorofeno en lanolina.

Clearasil: Hexaclorofeno 1,50% en base jabonosa.

Decomed: clorhidrato de alkildimetilbencil-amonio 10%, aceite de coco 60% y talco 0,27%.

Decomed: Nueva Fórmula. Jabón líquido bactericida. Contiene: cloruro de benzalconio (Sol. 1.750) 10 cc Vehículo c.sp 100 cc. Elimina las bacterias

patógenas gram positivas y gram negativas. No ionico, no contiene alcali libre ni hexaclorofeno.

Dermolate: Jabón y Loción Dermolate: detergente cutáneo.

Dermly-Soap: a base de aceite de cade (enebro) y bálsamo del Perú, de baja alcalinidad. Jabón Dérmico-Glicerinado.

Dial: hexaclorofeno y 3, 4, 4, tricloro carbanilida.

Diadex-phís: Sustituto del jabón. Desinfectante de la piel-como germicida, bactericida y bacteriostático. Contiene: Diadetoxil (Alquil aril polieter sulfonato sódico) 50 gm. Timol 0,05 gms. Ritolan 0,5 gm= Lanolina líquida pura).

Drula: Jabón- con oxiclورو de bismuto al 2%.

Elmor: Sales sólidas de ácidos grasos 94,50%, fungicidas y bactericidas, glicerina, éster de ácido graso y lanolina.

Fisohex: Antiséptico dérmico para uso tópico. Jabón líquido : hexaclorofeno 3% Entulfón 3% (éter sulfonato de sodio), colesteroles de lanolina y excipientes. Contiene Entulfón sódico (éter de octil fenoxietoxil-etilsulfonato sódico 50 gm). Hexacloro-Difenil-Metano-3 gm. Colesteroles de lanolina 0,7 gms. Excipiente cs.

Fisoderm: Jabón líquido parecido al Fiso-Hex pero sin hexaclorofeno .
Hyper-Phase: hexaclorofeno, lanolina etoxilada, carbamida y petrolato líquido.
Lifebuoy: salicilanilida brominada.

Lux: (sin fórmula). Jabón Lux con "Crema nutritiva", este último es muy perfumado puede producir dermatitis.

Lubricid: Jabón-contiene: 8% de ácidos grasos alquílicos que protegen la piel de la excesiva resequedad.

Marcelle: Jabón Hipoalergénico sin perfume para la piel hipersensible.

Neutro-Glicerina: Transparente. Hipoalérgico.

Neutrógena: Contiene Trietanolamina. Acidos grasos de peso molecular elevado y glicerina. (Neutralizante-Glicerinado) Hipo-alérgico.

Neko: de 1% al 2% de biyoduro de mercurio. (puede producir dermatitis por contacto).

Oilatum: aceite de maní 75% (polímeros de aceites vegetales no saturados)

8x4 Jabón: Dioxi-hexaclorodifenilmetano más 10 sustancias. Súper grasas, aceites esenciales y colorante dióxido de titanio.

Sulfurosos: ((AKKI) Azufre 10%. (Productora Alba C.A. Venezuela) del Dr. Kaufmann, sustancia activa es el azufre coloidal.

Resulin: Contiene ácido salicílico.

Safagard: contiene carbanilidas y 2 salicilanilidas desodorante y anti-microbiano.

Pears: Jabón transparente natural. Contiene. Glicerina, aceites naturales, cedro y tomillo. Indicado en pieles muy delicadas.

Nivea: Jabón Hipoalérgico. Sólido y líquido.

Vi-tar: Jabón con aceite de cade 10% (Juniper Tar) (Enebro).

Como se ve por la composición de los jabones, éstos son de naturaleza compleja, casi todos tienen posibilidades de producir dermatitis o fotosensibilización. En el libro "Cosmética Dermatológica Práctica" de Marcial Quiroga y Carlos F. Guillot, 3ra. Edit. El Ateneo, Buenos Aires 1969 se lee:

Los ácidos grasos saturados de peso molecular bajo como el láurico y mirístico son más sensibilizantes e irritantes que los de peso molecular alto. El aceite de coco tiene muchos ácidos grasos saturados de peso molecular bajo es más sensibilizante que el aceite de oliva y el hidróxido de sodio.

El uso de los jabones debe ser cuidadoso; los antibacterianos no deben usarse rutinariamente, sino en casos de indicación precisa, aún el color agregado puede producir dermatitis.

El hexaclorofeno puede producir dermatitis por contacto, usado en superficies denudadas extensas o por largo tiempo podría absorberse en cantidad suficiente para producir síntomas del sistema central. El hexacloroformo no produce foto-dermatosis.

La salicilanilida (Jabón Safeguard) puede determinar fotosensibilidad.