# HIPERQUERATOSIS DE LA AREOLA Y DEL PEZON *

Dra. Mary Guzmán de Fleury **
Dr. Jaime Piquero ***
Dr. Oscar Reyes ***

## INTRODUCCION

La Hiperqueratosis de la areola y del pezón, es una afección rara de la piel, que afecta predominantemente al sexo femenino, en su segunda o tercera década de la vida, generalmente bilateral y asintomática.

Oberste-Lehn 1 localiza 11 casos publicados y reporta dos adicionales. Posteriormente Amir M. [2] y colaboradores publican dos casos más haciendo un total de 15 casos en la literatura mundial.

Describiremos un caso de Hiperqueratosis de la areola y del pezón con un breve comentario acerca de la entidad.

## Caso clínico:

Paciente de sexo femenino, de 31 años de edad, vista en consulta externa en Octubre de 1978 por presentar cambios cutáneos que envolvían ambas areolas con extensión a pezones. Estos cambios se notaron 3 años antes cuando cursaba su primera gestación.

## Examen físico:

Formaciones verrugosas, de color marrón-negruzco, de superficie suave untuosa, que confluían estrechamente y ocupaban toda la areola. Las lesiones eran asintomáticas (Foto 1).

---

* Trabajo realizado en el Instituto Nacional de Dermatología.
** Residente de Post-grado de Dermatología, IND Hospital Vargas, Caracas.
*** Adjunto del Servicio de Dermatología Hospital Vargas. Caracas.
**** Dermopatólogo del Instituto Nacional de Dermatología. Caracas.

**Foto N° 1**

**Hallazgos histopatológicos:**

Los cortes coloreados con Hematoxilina y Eosina mostraron elongación papilomatosa de epidermis hacia el tejido conectivo. Acantosis discreta. Hiperqueratosis o toqueratótica, presencia de tapones corneos. Las formaciones papilomatosis engloban vasos dilatados. Discreto infiltrado inflamatorio, tipo linfocitario, perivascular. (Ver Foto 2 con aumento de 5 x y Foto 3 con aumento de 10 x.)



**Foto N° 2**



**Foto N° 3**

## Comentarios

La hiperqueratosis de la areola y del pezón es una afección cutánea rara; estando referida sólo en el texto de Dermatología de Rook [3] y asociados.

Levy-Franckel [4] clasificó la afección en tres variedades distintas: la primera llamada Hiperqueratosis de la areola y del pezón como extensión de un Nevus epidérmico; la segunda asociada a la Ictiosis congénita o adquirida y la tercera, es la llamada forma nevoide representada por el caso descrito en la presente publicación, la cual se presenta más frecuentemente en mujeres, entre segunda y tercera década de la vida, asintomática, simétrica, bilateral y sin trastorno hormonal evidente. El estudio histopatológico es muy similar a lo reportado por los autores mencionados con anterioridad.

Cualquiera de las variedades de tal entidad no responden a tratamiento esteroideo, sólo se plantearía a la paciente la necesidad de corrección quirúrgica por parte de cirugía plástica con fines cosméticos.

## Resumen

Se presenta un caso de Hiperqueratosis de la areola y del pezón forma nevoide, en una paciente del sexo femenino con un breve comentario de la entidad. Se hace una revisión de la literatura mundial.

**Summary**

A case of hyperkeratosis of the nipple and areola is described, characterized by a nevoid form in a female patient with a brief review of this entity. A revision of the world literature is included.

## BIBLIOGRAFIA

1. Oberste-Lehn H. Hiperkeratosen in Bereich Von Mamille and Areola. Z. Haut Geschlechtskr 8:388-393, 1950.
2. Amir Mehregan et al. Hiperkeratosi of Nipple and Areola. Arch Derm 113:1691-1692, 1977.
3. Rook A, Wilkinson D S, Ebling F J G: Textbook of Dermatology, ed 2. Oxford, England, Blackwell Scientific Publication, 1972, p. 1743.
4. Levy-Franckel A. Les Hyperkeratoses de l'areole et du mamelon. Paris Med 28:63-66, 1938.