

HIDRADENOMA PAPILLIFERUM

REPORTE DE DOS CASOS

*Dr. Luís Gómez Carrasquero**

*Dr. Oscar Reyes***

Dos pacientes observados en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario han servido para hacer hincapié en el diagnóstico del *Hidradenoma Papilliferum*.

El Hidradenoma Papilliferum fue descrito originalmente por Werth en 1878 y de localización vulvar, aunque más recientemente Helwig y colaboradores, estudiando un grupo de casos también observaren la situación perianal, desde luego todos en pacientes femeninos.

Clínicamente se presenta como un tumor, único, hemiesférico, superficial, bien circunscrito, móvil, indoloro, usualmente duro o de consistencia quística, más frecuentemente situado en labios mayores de la vulva y de aproximadamente 1 cm. de diámetro. Pudiendo ser del color de la piel, violáceo, o rojo semejando un Granuloma Telangiectaticum. Esta clínica no es patognomónica pero por la localización y las características mencionadas debe pensarse en *Hidradenoma Papilliferum*.

No se conocen transformaciones malignas de este tumor y su diagnóstico histológico es relativamente sencillo (Foto 1), aunque presenta semejanzas con el Papiloma Intraductal de la mama, tiene su origen en las glándulas apocrinas de la región génito-anal de mujeres adultas.

Casos Clínicos

1) S. G. de 27 años. Nódulo en vulva de lento crecimiento y sin síntomas. Al examen: nódulo rugoso (Foto 2) de 1 cm. de diámetro, hemiesférico, rojo brillante, duro, húmedo, en cara interna del labio menor izquierdo y sin sangramiento ni dolor.

* Instructor, Cátedra de Dermatología y Sifilografía, U.C.V.

** Profesor Agregado, Cátedra de Dermatología y Sifilografía, U.C.V.
Trabajo realizado en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas, Prof. Carlos J. Alarcón, Jefe del Servicio.




Foto N° 1.- Numerosos ejes conjuntivos, de longitud variable ("vellosidades"), entrelazados irregularmente tapizados por células cilíndricas alargadas, formando empalizada y circunscribiendo espacios lacunares de forma y tamaño variables, en algunos de los cuales puede observarse un contenido amorfo.



Foto N°2

2) T. M. de M. 32 años Tumorción en vulva asintomática y de evolución imprecisa. Al examen : nódulo liso, ovalado, de 1,5 cm. de diámetro mayor, tenso, translúcido, por debajo de la epidermis, de coloración violácea, de consistencia quística e indoloro, situado en 1 /3 medio labio mayor derecho.

El *Hidradenoma Papilliferum* es un tumor pocas veces diagnosticado en nuestro medio, posiblemente por su infrecuencia y falta de síntomas. Hemos querido insistir en estos dos reportes clínico-patológicos en la posibilidad de un fácil diagnóstico por los Ginecólogos, Venereólogos y Dermatólogos, si se piensa en él.

SUMARIO

Se presentaron dos pacientes con *Hidradenoma Papilliferum* haciendo hincapié en los aspectos clínico-patológicos para hacer un fácil diagnóstico. Los autores creen que la afección es más frecuente en nuestro medio, aunque su diagnóstico es raro, por las pocas ocasiones en que los Ginecólogos, Venereólogos y Dermatólogos piensan en él.

SUMMARY

Two patients with *Hidradenoma Papilliferum* are presented.

Emphasis on the clinical and histological diagnosis are made. The authors believes these tumors are seldom diagnosed in our services (Gynecology, Venereology & Dermatology) because a very few think of it.

BIBLIOGRAFIA

Meeker, J. H., Neubecker, R. D. and Helwig, E. B.: *Hidradenoma Papilliferum*. AM. J. Clin. Path.: 37: 182, 1962.