

CONSIDERACIONES SOBRE EL GRANULOMA VENEREO ANALISIS DE 130 CASOS

Dr. Rafael Medina*

El granuloma venéreo continúa siendo una afección curiosa, con ciertos aspectos que permanecen todavía oscuros o dudosos.

La distribución geográfica en América, es muy irregular. Su hallazgo es frecuente en los EE.UU. de Norte América, especialmente en ciertos grupos humanos de los Estados del Sur; en México y otros países centrales es relativamente raro; en Venezuela y Brasil y al parecer en Colombia, los casos son comunes ; hacia el Sur la frecuencia es mucho menor, llegando a ser casi desconocido en Uruguay, Chile y Argentina. No disponemos de referencias concretas respecto a su incidencia en otros países del Continente Americano.

La epidemiología no es clara: se le encuentra en hombres y mujeres de hábitos sexuales normales y también en muchos homosexuales varones; pero es excepcional precisar la fuente de contagio de los pacientes. Llama la atención el bajo número de prostitutas infectadas que se comprueba en los exámenes rutinarios de los Servicios Antivenéreos.

En el curso de los últimos 10 años hemos tenido oportunidad de estudiar 130 casos de granuloma venéreo integrados por 96 hombres y 34 mujeres. Brevemente haremos referencia a algunos hechos encontrados.

En cinco mujeres se comprobaron ulceraciones de esta naturaleza en la incisión de episiotomía efectuada una a tres semanas antes ; los maridos resultaron sanos al examen.

Fue diagnosticada la enfermedad en región perianal, en diferentes grados de extensión, en 28 pederastas pasivos.

En 12 pacientes con lesiones peneanas y de hábitos heterosexuales, el interrogatorio demostró que el último contacto lo habían tenido con homosexuales.

Cinco individuos con lesiones granulomatosas peneanas discretas y que venían efectuando coitos normales frecuentes con sus compañeras de vida marital, no las infectaron hasta que por motivo de haber salido embarazadas, decidieron cohabitar anormalmente.

En 13 pacientes mayores de 50 años, en los que la enfermedad tenía 6 meses a 2 años de evolución, se comprobó la asociación con epitelomas de tipo espinocelular.

* Instituto Nacional de Venereología.
Cátedra de Medicina Tropical. Universidad Central. Caracas.

Solamente una vez se observó la diseminación sistémica de la afección, en una mujer de unos 50 años de edad, quien murió a pesar de la variada e intensa terapia antibiótica.

En 6 prostitutas se evidenció *Donovania granulomatis* en material tomado del cervix uterino, aparentemente normal.

Se fracasó en transmitir la afección a 4 veteranas prostitutas de 40 a 42 años de edad.

El análisis de este material nos lleva a recordar algunos conceptos emitidos hace muchos años y a plantear otros, que deben ser objeto de investigaciones.

1.-El granuloma venéreo no se contagia fácilmente; el receptor indudablemente necesita de especiales condiciones predisponentes que sólo en ocasiones se reúnen. Posiblemente éste sea el motivo de la común observación de que una de las parejas de vida marital permanezca sana, a pesar de tener contactos frecuentes con la enferma.

2.-En sujetos que no son jóvenes, la afección parece propiciar el desarrollo de carcinomas, por lo cual los exámenes rutinarios de laboratorio en esta clase de enfermos, siempre deberán complementarse con el estudio histopatológico.

3.-Algunas mujeres jugarían el papel de portadoras aparentemente sanas. Si esto llegara a demostrarse en forma definitiva, explicaría en gran parte lo infructuoso que es el hallazgo de los contactos.

4.-La región anal parece ser uno de los sitios donde mejor se desarrolla y mantiene virulenta la bacteria; ello sería la causa de su hallazgo frecuente en homosexuales varones.

RESUMEN

El trabajo es un análisis de 130 casos de granuloma venéreo (96 hombres y 34 mujeres) estudiados en los últimos 10 años. Se hace referencia a algunos hechos encontrados. En cinco mujeres se comprobaron ulceraciones de esta naturaleza en la incisión de episiotomía efectuada una a tres semanas antes; los maridos resultaron sanos al examen. Fue diagnosticada la enfermedad en región perianal, en diferentes grados de extensión, en 28 pederastas pasivos. En 12 pacientes con lesiones peneanas y de hábitos heterosexuales, el interrogatorio demostró que el último contacto lo habían tenido con homosexuales. Cinco individuos con lesiones granulomatosas peneanas discretas y que venían efectuando coitos normales frecuentes con sus compañeras de vida marital, no las infectaron hasta que por motivo de haber salido embarazadas, decidieron cohabitar anormalmente. En 13 pacientes mayores de 50 años, en los que la enfermedad tenía 6 meses a 2 años de evolución, se comprobó la asociación con epitelomas de tipo espinocelular. Solamente una vez se observó la diseminación sistémica de la afección en una mujer de unos 50 años de edad, quien murió a pesar de la variada e intensa terapia antibiótica. En 6 prostitutas, se evidenció *Donovania granulomatis* en material tomado del cervix uterino aparentemente normal, dando así la impresión de que algunas mujeres jugarían el papel de portadoras aparentemente sanas. Se fracasó en transmitir la afección a 4 veteranas prostitutas entre 40 y 42 años.

SUMMARY

The work deals with analysis of 130 cases of venereal granuloma (96 men and 34 women) studied during the last 10 years. Reference is made therein to the facts as encountered.

In 15 women, ulcerations of this nature were verified at the site of the episiotomy, practiced from 1 to 3 weeks previously; their husbands having been found healthy upon examination.

The disease was diagnosed within the perianal region, at different grades of extension, upon 28 passive pederasts.

In 12 patients having penial lesions and heterosexual habits, the interrogatory disclosed that their last contact had been with homosexuals.

Five individuals having discrete granulomatous lesions, who had been practising frequent normal coition with their habitual mates, did not infect them until and by reason of their becoming pregnant, they did resort to abnormal intercourse.

In 13 patients over 50 years of age, upon whom the disease had been in evolution from 6 months to 2 years, it was verified the association of epitheliomas of the spinocellular type.

Solely once was it observed, the systemic dissemination of the disease in a woman of about 50 years of age who died, notwithstanding the diverse and intense therapy used.

In 6 prostitutes, *Donovania granulomatis* was evidenced on material taken from the apparent normal cervix of the uterus, which leads to the impression that some women would play the role of carriers apparently healthy.

Intent failed to transmit the disease to 4 veteran prostitutes of ages between 40 and 42 years.

BIBLIOGRAFIA

1. Sánchez Covisa J. y Guerra P. Peculiaridades Dermato-Sifilográficas en Venezuela. Primeras Jornadas Venezolanas de Dermatología y Venereología, febrero, 1943.
2. Eiseberq A. A. Extragenital Granuloma Inguinal. Am. Jour. of Syph. Gonor. and V. D. Vol. 32, N° 5. Sep. 1948.
3. Grenblatt R. B., Barfield W. M. Dienst R., West R. and Zises M. A. Five years Study of Antibiotics in the treatment of Granuloma Inguinale. Am. Journ. of Syph. Gonor. and V. D. Vol. 36, N° 2, mayo, 1952.
4. Medina R. e Irazábal P. Consideraciones sobre la epidemiología del Granuloma Venéreo en Caracas. Mem. VI Congreso Venezolano de Ciencias Médicas. Vol. V, noviembre, 1955.
5. Goldber J. and Bernstein. Studies on Granuloma Inguinale. Brit. Vener. Dis. Vol. XL. N° 2. June, 1964.
6. Rajan R. V. and Rangiah P. N. "Donovanosis" W. H. O. Monograph. Series N° 24.