

ACTUALIDADES DERMATOLOGICAS

DERMATOFITOS IDENTIFICADOS EN CARACAS (VENEZUELA) DATOS PARCIALES DANTE BORELLI *

En los registros de la Sección de Micología, Cátedra de Dermatología y Sifilografía, Escuela de Medicina, Universidad Central de Venezuela, la cual funciona en el Hospital Vargas de Caracas, han sido anotados los datos correspondientes a 2.000 problemas micológicos, en el período comprendido entre el día 1 de octubre de 1948 y el día 18 de noviembre de 1957.

Durante estos nueve años se han estudiado pacientes provenientes principalmente de la ciudad capital y sus alrededores, referidos por los miembros de la Cátedra y otros especialistas. Algunos materiales han sido recogidos directamente en otras zonas del territorio nacional, como la isla Margarita; otros han sido recibidos de médicos residentes en la Isla Margarita (Dra. A. Dobrovolska, Dr. H. Rasi), en la península de Paraguaná (Dr. Pedrique Alvarez), o pertenecientes a la División de Lepra en misión a los Andes (Dr. Alborno). Gran parte del material de **tinea capitis** estudiado en los primeros años, y una parte considerable del mismo material estudiado sucesivamente, fue procurado por el Dr. Juan Di Prisco, quien lo ilustró desde el punto de vista clínico. Dos cepas de **Microsporum audouinii**, incluidas en esta nota, fueron aisladas de dos pacientes del Dr. L. A. Velutini, quien publicó la observación con L. Montemayor. En una lista de cien mohos pató-

genos aislados en Caracas, comentada ante el VI Congreso Venezolano de Ciencias Médicas (1955), estaban incluidas 82 cepas de dermatofitos, que también figuran en la presente estadística.

Los primeros 685 exámenes registrados, han sido realizados por el Prof. L. Montemayor, quien dirigió el laboratorio hasta fines de 1952. Los exámenes sucesivos han sido efectuados por quien escribe, a partir de octubre de 1954.

En total, 407 cepas de dermatofitos han sido identificadas, las cuales han sido asignadas por géneros y especies, así:

TRICHOPHYTON: 274 cepas

mentagrophytes	118
tonsurans	79
rubrum	70
violaceum	4
schonleinii	3

MICROSPORUM: 96 cepas

canis	83
gypseum	11
audouin	2

EPIDERMPHYTON: 33 cepas

floccosum	33
Dermatofitos de especie no identificada	4
Total, cepas de dermatofitos	407

* Jefe de la Sección, Director de la
Cátedra: Prof. Dr. C. J. Alarcón.

Algunas de las cepas identificadas durante los primeros años, fueron registradas con nombres que actualmente son considerados sinónimos de los comprendidos en esta lista. Hemos creído útil sustituir los sinónimos con los nombres válidos correspondientes. Así, bajo el rubro de **Trichophyton mentagrophytes** se han reunido las cepas que figuran en el registro como **Trichophyton mentagro-**

phytes y **Trichophyton asteroides**; como **Trichophyton tonsurans** figuran las que originalmente fueron denominadas **Trichophyton tonsurans**, **Trichophyton epilans**, **Trichophyton crateriforme**, **Trichophyton cerebriforme** y **Trichophyton sulphureum**; en **Trichophyton rubrum** figuran las registradas como **Trichophyton rubrum** y **Trichophyton purpureum**.