

SIGNOS CUTÁNEOS DE LA INFECCIÓN POR VIH

- Erupción de la primoinfección por VIH
- Patología tumoral cutánea y mucosa
 - Sarcoma de Kaposi
 - Linfomas
 - Carcinoma epidermoide

- Infecciones
 - Bacterianas
 - Micobacterianas
 - Virales
 - Micosis
 - Parasitosis

- Manifestaciones no infecciosas Dermatitis
 - Seborreica Psoriasis
 - S. de Fiessinger-Leroy-Reiter
 - Pitiriasis Rubra pilaris
 - Toxicodermias
 - Proliferaciones vasculares no kaposi
 - Erupciones pruriginosas
 - Vascularitis
 - Erupciones liquenoide
 - Fotodermatosis
 - Porfiria Cutánea tarda
 - Dermatosis ampollar autoinmune
 - Pseudoflebitis hiperálgicas
 - Aftas Lesiones mucosas bucales

- Púrpura trombopénica
- Vaccinación
- Granuloma anular
- Hidradenitis ecrina neutrofílica
- Déficit Vitamínico
- Pigmentaciones
- Lesión de faneras

(*)Tomado de: Janier M, Caumes E. Signes cutanés de l'infection par le virus de Pinmunodeficiencia humaine (VIH) - Editions techniques- Encycl. Méd. Chir (Paris-France), Dermatologie, 12-680-A-110, 1994, 12 p.

Clasificación de la enfermedad de Kaposi de SIDA según Clauvel

- Estadio I: Menos de 5 lesiones cutáneas o mucosas.
- Estadio II: Más de 5 lesiones cutáneas o mucosas.
- Estadio III: Ataque visceral (pulmón, pericardio o profuso del tubo digestivo).

A: Ausencia de /B: Presencia de

- ó Infección oportunista
- ó Fiebre inexplicable
- ó Diarrea inexplicable
- ó Pérdida de pesos 5 kg.
- ó CD4 200/mm³

FE DE ERRATAS

Dermatología Venezolana 1993; 31: 162-166.

En la página 163

Donde dice: complejo Leishmaniasis braziliensis / complejo Leishmaniasis mexicana.

DEBE DECIR: complejo Leishmania braziliensis / complejo Leishmania mexicana.