

FICHAS RESUMENES

ADVANCED ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME - RELATED KAPOSI'S SARCOMA. Parkash S., Rarick M., Espina B., Louveiro C., Bernstein Singer M. et al. Cancer 65: 1074-1078. 1990.

Un estudio piloto fue llevado a cabo para evaluar la eficacia y toxicidad de 2 regímenes de quimioterapia en el tratamiento de una forma avanzada o progresiva del Sarcoma de Kaposi. Se formaron 2 grupos de pacientes: 21 pacientes grupo I, 12 pacientes grupo II con un total de 33 pacientes. Los regímenes de quimioterapia consistían en Bleomicina (10 mgr/m²), Vincristina (1,4 mg/m²) y Adriamicina (10 mg/m² para el grupo I y 20 mg/m² para el grupo II). Se administró en forma E.V. cada 2 semanas hasta que la toxicidad fuese intolerable o hasta la máxima respuesta antitumoral. La mejor respuesta (remisión parcial o completa) fue obtenida en un 79% de los casos. Los efectos tóxicos consistieron en náuseas, caída del cabello y neuropatía periférica. La supresión de médula ósea se expresó por una neutropenia (<1000/m³) que ocurrió en 1/3 de los casos. Las infecciones oportunistas ocurrió en la mayoría de los casos relacionada con disfunción de la inmunidad celular expresada por una disminución de linfocitos CD4⁺. Se concluye que la quimioterapia combinada con Adriamicina, Vincristina y Bleomicina puede ser beneficiosa en casos de SIDA relacionados con Sarcoma de Kaposi.

Dr. Vielma

CRUSTED SCABIES IN ADQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME. Wishnow I., Lynn B. Int. J Dermatol 29, NO 4; 287-289. 1990.

Se evalúa un caso de escabiosis costrosa en un hombre de 44 años con historia de abuso de drogas IV y HIV+ . Presentaba desde hace 4 meses una erupción muy pruriginosa que comenzó en abdomen y se extendió a codos, rodillas, espalda y regiones inguinales. Fue evaluado inicialmente por el servicio de emergencia donde se indicó esteroides tópicos por 1 mes pensando se trataba de una psoriasis sin lograr mejoría. Previo a la instalación del cuadro eruptivo presentó pérdida de peso y linfadenopatía generalizada. Al examen físico presentó placas hiperqueratóticas gruesas en codo, escápulas, espalda, pliegue interglúteo, genitales y área suprapúbica con descamación importante. La cara, palmas y plantas estaban respetadas. Al examen microscópico se observaron numerosos ácaros móviles. Se trató con Lindano al 1 % en 3 aplicaciones de 12 horas, con intervalo de 3 días entre cada aplicación. Se observó mejoría dramática de las lesiones y del prurito. El paciente muere 4 meses después sin evidencia de recidiva de la enfermedad cutánea.

Dr. Jaime Battan