Reporte

DISQUERATOSIS ACANTOLITICA DE LA VULVA
Presentación de dos Casos

Dr. José R. Sardi B.*
Dra. Homagdy Rodríguez de Arévalo*
Dra. Omaira Castellano de Camejo*
Dr. Samuel Mendoza S.**

SUMARIO

Se presentan dos casos de Disqueratosis acantolítica de la vulva y se discute la histología de la afección.

SUMMARY

Two cases of Dyskeratosis acantolitic are presented. We discuss the histological aspect of this condition.

PALABRAS CLAVES: Disqueratosis. Acantolisis. Enfermedad vulvar.

El presente trabajo tiene como propósito, comunicar dos casos observados por nosotros de una nueva entidad clínica descrita por los doctores Tadeusz P. Chorzelski, Jan Kudejko y Stefania Jablonska (1).

La primera paciente tenía 29 años de edad, natural y procedente de Caracas, de piel morena clara, relató la aparición de una erupción asintomática constituida por pápulas aisladas y confluentes, de color blanquecino, maceradas, localizadas en la región vulvar y perianal, con cuatro meses de evolución. La biopsia fue reportada como "Enfermedad de Hailey-Hailey" (1, 2) (fotos).

El otro caso correspondía a una joven de 19 años de edad, natural de Barlovento y residenciada en Caracas, de piel morena, que tenía una erupción de pápulas blanquecinas lisas, localizadas en la vulva y región perianal, asintomáticas, con una evolución de ocho meses. El estudio histológico fue reportado cónsono con "Enfermedad de Hailey-Hailey vs Enfermedad de Darier" (3, 4) (fotos).

En los dos casos no había historia familiar sugestiva de enfermedad alguna, y el examen físico general resultó completamente normal.

Histológicamente encontramos: hiperqueratosis con paraqueratosis, acantosis focal con acantolisis y disqueratosis en todo el espesor del epitelio. Clivaje suprabasal con formación de lagunas y presencia de vellosidades (5, 6) (fotos).

Estos hallazgos histológicos pueden enmarcarse en lo que B. Ackerman

Foto Nº 1 Aspecto clínico del caso Nº 1

Foto Nº 2. Aproximación en la región perianeal

* Del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Caracas.

** Dermatólogo en ejercicio privado.

Foto Nº 3 Aspecto clinico del caso nº 2

Foto No 4. Aproximación en la región perianal.



Foto Nº 5 Panorámica Histológica



Foto No 6. Aproximación para mostrar la disqueratotis y acantólisis.

Lesión Única	Clínicamente inaparente.		
	Popular.		
	Nódular (Disqueratosis acantolítica).		
Lesiones Múltiples	Persistente	Generalizada (Enf. Darier)	
		Sistematizado	
	Evanescente	Dermatosis acantolítica transitoria.	

llamó disqueratosis focal acantol ítica, condición que puede equipararse al fenómeno de hiperqueratosis epidermolítica, porque ambos pueden verse en una variedad de patologías, que van desde condiciones clínicamente inaparentes, hasta enfermedad diseminada, como la enfermedad de Darier para el fenómeno de disqueratosis focal acantolítica y la Eritrodermia ictiosiforme congénita para la hiperqueratosis epidermolítica.

En un intento de agrupar estas patologías, el Dr. B. Ackerman propuso la siguiente clasificación (5)

En este orden de ideas la Disqueratosis acantolítica de la vulva, sería una forma de disqueratosis focal acantolítica múltiple persistente.

Reportes posteriores informan de localizaciones diferentes, como en el canal anal y en la piel del pene (2, 3, 4).

BIBLIOGRAFIA

1. Chorzelski, T.P., Kudejko, J., Jablonska, S.: Is papular acantholytic dyskeratosis of the vulva a new entity? Am. J. Dermatopathol. 6: 557-560, 1984.

2. Wakel, R.L., Jager, R.M.: Focal acantholytic dyskeratosis of the anal canal. Am. J. Dermatopathol. 8: 362-363, 1986.

3. Coppola, G., Muscardin, L.M.: Papular acantholytic dyskeratosis. Am. J. Dermatopathol. 8: 364, 1986.

4. Van der Putte, S.C.J., Oey, H.B.: Papular acantholytic dyskeratosis of the penis. Am. J. Dermatopathol. 8: 365-366, 1986.

5. Ackerman, B.: Focal acantholytic dyskeratosis. Arch. Dermatol. 106: 702-706, 1972.