


Manejo de carcinoma basocelular de alto riesgo

Miguel López, Paola Pasquali

Editor. E-mail: editor.revista@gmail.com



Características de un CBC de alto riesgo

Ubicación clínica/Tamaño*:

- Área H ≥ 6 mm
 - Área M ≥ 10 mm
 - Área L ≥ 20 mm
- Bordes mal definidos, recidivante, con inmunosupresión o radioterapia previa

Histopatología:

Tipos micro-nodular, infiltrante y/o esclerodermiforme, con afectación perineural

(*) Definición anatómica según el riesgo de recidiva:

- Área H (Riesgo alto): Área de la máscara (área central de la cara, párpados, cejas, periorbitario, nariz, labios, mentón, mandíbula, pre y post-auricular, pabellón auricular y región temporal), genitales, manos y pies
- Área M (Riesgo medio): Regiones geniana y frontal, cuello y cuero cabelludo
- Área L (Riesgo bajo): Tronco y extremidades

Referencias

1. Miller SJ, Moresi JM. Actinic keratosis, basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. En: Bologna JL, et al: Dermatology. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2003.
2. Greenway HT, Maggio KL. Mohs micrographic surgery and cutaneous oncology. En: Robinson JK, et al: Surgery of the skin. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2005.